

g 1-propanolla, 0,056 g kvaternaarisia ammoniumyhdisteitä, apuaineita ja vettä.

## NO (Norsk)

**TILTEMK FORMAL:** Bepro Disinfectant Spray er et overflatedesinfeksjonsmiddel og rengjøringsmiddel basert på alkoholer og kvartære ammoniumforbindelser. Desinfeksjonssprayen er ideell for hurtig desinfisering og rengjøring av ikke-invasive medisinske innretninger som operasjonsbord, sykkelstær, IV-stativer og tanleggestøler. Det lave alkoholinholdet på mindre enn 50 % sikrer høy materialkompatibilitet og reduserer potensialet for allergi og hudirritasjon. Bepro Disinfectant Spray har en diskret sitronduft.

**TILTEMK BRUKERE:** Produktet er ment for bruk av tannleger eller helsepersonell med spesifikf kunnskap om desinfisering av medisinsk utstyr. Produktet skal ikke brukes direkte på pasienter.

**EFFEKTIV SPEKTRUM:** Bakteriendeplende (EN 13727:2012 + A2:2015\*, EN 16615:2015\*) 60 sek; tuberkulostatisk (EN 14348:2005\*) 60 sek; mykobakteriendeplende (EN 14348:2005\*) 60 sek; gjærendeplende (EN 13624:2013\*, EN 16615:2015\*) 60 sek; kappekledde virus (EN 14476:2013 + A1:2015\*) 15 sek; virusdeplende (EN 14476:2013 + A1:2015\*) 60 sek

<sup>\*</sup> Testet under lav organisk belastning / <sup>\*</sup> Testet under høy organisk belastning

**BRUKSANVISNING:** For din egen sikkerhet, bruk engangshansker og vernebriller. Fukk og tørk av hele overflaten av det medisinske utstyret helt. La desinfeksjonsmidlet virke og følg kontakttidene. Bruk bare på alkoholkompatible materialer. For første gangs bruk, test materialets kompatibilitet på å påføre desinfeksjonsmidlet på et lite iøynefallende område. En liste over kompatible og inkompatible materialer er tilgjengelig på nettstedet vårt. Hvis du er usikker på materialets sammensetning, prøv å teste medisinske utstyret, kontakt produsenten for bruk.

**BEGRENSNINGER:** KUN FOR PROFESJONELL BRUK. Ikke till bruk på invasive medisinsk utstyr. Ikke bland med andre produkter. Forsikre deg om at all synlig tilsmussing er fjernet før desinfisering.

**HÅNDRERING:** FARE H226 Brannfarlig væske og damp. H318 Gir alvorlig øyeskade. H336 Kan forårsake dosighet og svimmelhet. P210 Holdes borte fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røying forbudt. P233 Hold beholderen tett lukket. P261 Unngå innånding av stov/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P280 Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsbeskyttelse. P305 + P331 + P338 VED KONTAKT MED ØYENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P501 Avhend innhold/beholder i henhold til lokale og nasjonale forskrifter. For mer informasjon, se sikkerhetsdatablad tilgjengelig på nettstedet vårt.

**OPPBÆRNING:** Oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilert sted. Hold borte fra direkte sollys, varme og åpen flamme. Oppbevaringstemperatur: <30 °C

**SAMMENSETNING:** 100 g inneholder 20 g etanol, 28 g 1-propanol, 0,056 g kvarteren ammoniumforbindelser, hjelpestoffer og vann.

## EL (Ελληνικά)

**ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:** Το Bepro Disinfectant Spray είναι ένα απολυμαντικό και καθαριστικό επιφανειών που βασίζεται στην αλκοόλη και στις τεταρτοαριές ενώσεις αμμωνίου. Το απολυμαντικό σπρέι είναι ιδανικό για την γρήγορη απολύμανση και καθαρισμό των μη επεμβατικών ιατροτεχνολογικών συσκευών, όπως χειρουργικά τραπέζια, φορεία, στατά, και οδοντιατρικά καρέκλες. Η χαμηλή περιεκτικότητά σε αλκοόλη, την οποία κατά το 50% εθαλοείθει υψηλή ευαισθησία για τα υλικά και μειώνει την πιθανότητα αλλεργιών και ερεθισμού του δέρματος. Το Bepro Disinfectant Spray έχει ένα διακριτό άρωμα λεμονιού.

**ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ:** Το προϊόν προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες στον χώρο της οδοντιατρικής ή περιβάλλοντα υγείας με ειδικές γνώσεις για την απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί απευθείας στους ασθενείς.

**ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ:** Βακτηριοκτόνο (EN 13727:2012 + A2:2015\*, EN 16615:2015\*) 60 δευτ.; φυματιοκτόνο (EN 14348:2005\*) 60 δευτ.; μυκοβακτηριοκτόνο (EN 14348:2005\*) 60 δευτ.; ζυμοβακτηριοκτόνο (EN 13624:2013\*, EN 16615:2015\*) 60 δευτ.; ιοί με έλτρο (EN 14476:2013 + A1:2015\*) 15 δευτ.; ιοκτόνο (EN 14476:2013 + A1:2015\*) 60 δευτ.

<sup>\*</sup> Δοκιμασμένο με χαμηλό οργανικό φορτίο / <sup>\*</sup> Δοκιμασμένο με υψηλό οργανικό φορτίο

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:** Για την απομικρία στο πρόσωπο, φορέστε γάντια μιας χρήσης και γυαλιά ασφαλείας. Βρέξτε πλήρως και ακουσίστε ολόκληρη την επιφάνεια του ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Αφήστε το απολυμαντικό να δράσει και ηρήσιτε το χρόνο επαφής. Χρησιμοποιήστε το μόνο σε υλικά συμβατά με την αλκοόλη. Πριν από την πρώτη χρήση, δοκιμάστε τη συμβατότητα του υλικού εφαρμόζοντας το απολυμαντικό σε μια μικρή δυσδιάκριτη περιοχή. Μια λίστα με συμβατά και μη συμβατά υλικά είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. Εάν δεν είστε βέβαιοι ως προς τη σύνθεση υλικών του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή πριν από τη χρήση.

**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:** ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Να μη χρησιμοποιείται σε επεμβατικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Μην αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα. Βεβαιωθείτε ότι το ορατό χρώμα έχει πλήρως αφαιρεθεί πριν από την απολύμανση.

**ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ:** ΚΙΝΔΥΝΟΣ H226 Υγρό και ατμικό εύφλεκτα. H318 Προκαλεί σοβαρά οφθαλμικά ή βλάβη. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπηλία ή ζάλη. P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές αναφλέξης. Μην καπνίζετε. P233 Να διατηρείται αο περιεκτής ερμητικά κλειστός. P501 Αποφύγετε να αναπνεύσει αναθυμιάσεις/ομίχλη/ατμούς/εκκευώματα. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέλα απομικρία προστασία για τα μάτια / πρόσωπο. P305 + P331 + P338 VED PERIPLOTHN EPLAFHSE ME TA MATIA: Στεγνώνετε προοεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P501 Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιεχόμενο σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας.

**ΑΠΟΒΛΗΤΑ:** Αποβλήτους σε δοσερόο, στεγνό και καλά αερισμένο χώρο. Κρατήστε μακριά από το άμεσο άμεσο φως, τη θερμότητα και την ανοιχτή φλόγα. Θερμοκρασία αποθήκευσης: <30 °C

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** 100 g περιέχουν 20 g αιθανόλης, 28 g 1-προπανόλης, 0,056 g ενώσεων τεταρτοαγούς αμμωνίου, βοηθητικά και νερό.

## SK (Slovenčina)

**URČENÝ ÚČEL:** Bepro Disinfectant Spray je prvotný dezinfekčný a čistiaci prostriedok na báze alkoholu a kvartérnych amoniónych zlúčenín. Dezinfekčný sprej je ideálny na rýchlu dezinfekciu a čistenie neinvazívnych zdravotníckych pomôcok, ako sú operačné stoly, zariadené stoly, intravenózne stojany a zubné kreslá. Nízky obsah alkoholu pod ako 50% zaisťuje vysokú kompatibilitu s materiálmi a znižuje riziko alergií a podráždenia pokožky. Bepro Disinfectant Spray má diskretnú citrónovú vôňu.

**CIEĽOVÍ ROUŽIVATEĽI:** Produkt je určený na použitie odborníkmi v oblasti stomatológie a zdravotnej starostlivosti, ktorí majú špecifické poznatky o dezinfekcii zdravotníckych pomôcok. Prípravok sa nemá používať priamo na pacientoch.

**SPEKTRUM ÚČINKU:** Bakteričné (EN 13727:2012+A2:2015\*, EN 16615:2015\*) 60 s; tuberkulidné (EN 14348:2005\*) 60 s; mykobakteričné (EN 14348:2005\*) 60 s; kvasinokčné (EN 13624:2013\*, EN 16615:2015\*) 60 s; obalené vírusy (EN 14476:2013+A1:2015\*) 15 s; virucidné (EN 14476:2013+A1:2015\*) 60 s

<sup>\*</sup> Testované pri nízkom organickom zaťažení / <sup>\*</sup> Testované pri vysokom organickom zaťažení

**ŤAVOD NA ROUŽITIE:** Na vlastnú ochranu po-

užívajte jednorazové rukavice a ochranné okuliare. Úplne navlhčite a utrite celý povrch zdravotníckej pomôcky. Nechajte dezinfekčný prostriedok pôsobiť a dodržte čas kontaktu. Používajte iba na materiály kompatibilné s alkoholom. Pred prvým použitím otestujte kompatibilitu materiálu. Načesť dezinfekčný prostriedok na malé skryté miesto. Zoznam kompatibilitných a nekompatibilných materiálov je k dispozícii na našej webovej stránke. Ak si nie ste istí materiálovým zložením zdravotníckej pomôcky, pred použitím sa obráťte na výrobcu.

**OBDMENZIA:** IBA NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE. Nepoužívajte na invazívnych zdravotníckych pomôčkach. Nemešajte s inými produktami. Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok, bordyágyak, infúziós állványok vagy fogorvosi székék gyors fertőtlenítésére. Alkohol-tartalmala alacsony (50% alatt), így sokfajta anyaggal kompatibilis, valamint csökkentheti az allergia, illetve a bőrirritáció kockázatát. A Bepro Disinfectant Spray használatakor diszkret citromillatott vagy maga után. A fertőtlenítő spray alkalmas a nem invazív orvostechnikai eszközök, például műtőasztalok

## EN (English)

**INTENDED PURPOSE:** Bepro Disinfectant Spray is a surface disinfectant and cleaner based on alcohols and quaternary ammonium compounds. The disinfectant spray is ideal for the rapid disinfection and cleaning of non-invasive medical devices.

**EINSCHRÄNKUNGEN:** NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ. Nicht für invasive Medizinprodukte geeignet. Nicht mit anderen Produkten mischen. Stellen Sie sicher, dass alle sichtbaren Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernt wurden.

**HANDHABUNG:** GEFAHR! H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P233 Behälter dicht verschlossen halten. P261 Einatmen von Rauch/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website.

**LAGERUNG:** An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und offener Flamme schützen. Lagertemperatur: < 30°C

**ZUSAMMENSETZUNG:** 100 g enthalten 20 g Ethanol, 28 g 1-Propanol, 0,056 g quaternäre Ammoniumverbindungen, Hilfsstoffe und Wasser.

\* Testetd under hög organic load / \* Testetd under high organic load

**INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING:** För your protection, wear disposable gloves and safety goggles. Completely moisten and wipe the entire surface of the medical device. Leave disinfectant to act and adhere to contact time. Use on alcohol compatible materials only. Before first time use, test material compatibility by applying the disinfectant to a small inconspicuous area. A list of compatible and incompatible materials is available on our website. If you are uncertain as to the material composition of the medical device, contact the manufacturer before use.

**LIMITATIONER:** FOR PROFESSIONAL USE ONLY. Not for use on invasive medical devices. Do not mix with other products. Make sure that all visible soiling has been removed before disinfection.

**HANDLING:** DANGER H226 Flammable liquid and vapour. H318 Causes serious eye damage. H336 May cause drowsiness or dizziness. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P233 Keep container tightly closed. P261 Avoid breathing fume/mist/vapours/spray. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P501 Dispose of contents/container in accordance with local and national regulations. For more information, please refer to Safety Data Sheet available on our website.

**STORAGE:** Store in cool, dry and well-ventilated facility. Keep out from direct sunlight, heat, and open flame. Storage temperature: < 30°C

**COMPOSITION:** 100 g contains 20 g ethanol, 28 g 1-propanol, 0,056 g quaternary ammonium compounds, auxiliaries and water.

## DE (Deutsch)

**ZWECKBESTIMMUNG:** Bepro Disinfectant Spray ist ein Flächendesinfektionsmittel basierend auf Alkoholen und quaternären Ammoniumverbindungen. Das Desinfektionsspray ist ideal für die Schnelldesinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten wie z.B. OP-Tische, Tragbahnen, Infusionsständer und zahnärztliche Behandlungseinheiten. Der geringe Alkoholgehalt von weniger als 50% gewährleistet eine hohe Materialverträglichkeit und reduziert das Potenzial für Allergien und Hautreizungen. Bepro Disinfectant Spray ist mit einem diskreten Zitronenduft parfümiert.

**VORGESEHENE ANWENDER:** Das Produkt ist für die Verwendung durch professionelle Fachkräfte im zahnmedizinischen oder gesundheitlichen Bereich mit spezifischen Kompetenzen für den Desinfektionsprozess von Medizinprodukten bestimmt. Das Produkt ist nicht für die direkte Verwendung am Patienten bestimmt.

**WIRKSPEKTRUM:** Bakterizid (EN 13727:2012 + A2:2015\*, EN 16615:2015\*) 60 sek.; tuberculozid (EN 14348:2005\*) 60 sek.; mykobakterizid (EN 14348:2005\*) 60 sek.; levurozid (EN 13624:2013\*, EN 16615:2015\*) 60 sek.; behüllte viren (EN 14476:2013 + A1:2015\*) 15 Sek.; viruzid (EN 14476:2013 + A1:2015\*) 60 Sek.

\* Getestet under geringer organischer Belastung / \* Getestet under hoher organischer Belastung

**ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:** Zum Selbstschutz Einweghandschuhe und Schutzbrille tragen. Die Fläche des zu desinfizierenden Medizinproduktes vollständig benetzen und abwischen. Desinfektionsmittel einwirken lassen und Einwirkzeit einhalten. Nur auf alkoholbeständigen Materialien anwenden. Bei Erstanwendung die Materialverträglichkeit des Desinfektionsmittels an unauffälliger Stelle überprüfen. Eine Liste kompatibler und inkompatibler Materialien ist auf unse-

rer Webseite verfügbar. Wenn Sie hinsicht-

lich der Materialzusammensetzung des Medizinprodukts Fragen haben, wenden Sie sich vor der Verwendung an den Hersteller des Medizinproduktes.

**EINSCHRÄNKUNGEN:** NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ. Nicht für invasive Medizinprodukte geeignet. Nicht mit anderen Produkten mischen. Stellen Sie sicher, dass alle sichtbaren Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernt wurden.

**HANDHABUNG:** GEFAHR! H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P233 Behälter dicht verschlossen halten. P261 Einatmen von Rauch/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website.

**LAGERUNG:** An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und offener Flamme schützen. Lagertemperatur: < 30°C

**ZUSAMMENSETZUNG:** 100 g enthalten 20 g Ethanol, 28 g 1-Propanol, 0,056 g quaternäre Ammoniumverbindungen, Hilfsstoffe und Wasser.

## ES (Español)

**FINALIDAD PREVISTA:** Bepro Disinfectant Spray es un desinfectante y limpiador de superficies a base de alcohol y compuestos de amonio cuaternario. El aerosol desinfectante es ideal para la rápida desinfección y limpieza de dispositivos médicos no invasivos como mesas de operación, camillas, portasueros y sillones de dentista. El bajo contenido de alcohol de menos del 50 % garantiza alta compatibilidad de materiales y reduce el potencial de alergias e irritaciones cutáneas. Bepro Disinfectant Spray tiene una discreta fragancia de limón.

**USUARIOS PREVISTOS:** El producto está diseñado para ser utilizado por un profesional dental o sanitario con habilidades específicas en el proceso de desinfección de productos sanitarios. El producto no está diseñado para su uso directo en pacientes.

**ESPECTRO DE EFECTIVIDAD:** Bactericida (EN 13727:2012 + A2:2015\*, EN 16615:2015\*) 60 Seg.; tuberculocida (EN 14348:2005\*) 60 Seg.; micobactericida (EN 14348:2005\*) 60 Seg.; levaduricida (EN 13624:2013\*, EN 16615:2015\*) 60 Seg.; virus con envoltura (EN 14476:2013 + A1:2015\*) 15 Seg.; virucida (EN 14476:2013 + A1:2015\*) 60 Seg.

\* Probado con baja carga orgánica / \* Probado con alta carga orgánica

**INSTRUCCIONES DE USO:** Para su protección, utilizar guantes desechables y gafas de seguridad. Humedecer completamente y limpiar toda la superficie del dispositivo médico. Dejar actuar el desinfectante y respetar el tiempo de contacto. Utilizar sólo en materiales compatibles con el alcohol. Antes de utilizarlo por primera vez, pruebe la compatibilidad del material aplicando el desinfectante en una pequeña zona no visible. Una lista de materiales compatibles e incompatibles está disponible en nuestro sitio web. Si no está seguro de la composición del material del dispositivo médico, comuníquese con el fabricante antes de usarlo.

**LIMITACIONES:** SOLO PARA USO PROFESIONAL. No apto para uso en dispositivos médicos invasivos. No mezclar con otros productos. Asegúrese de eliminar toda la suciedad visible antes de la desinfección.

**MANIPULACIÓN:** PELIGRO H226 Líquidos y vapores inflamables. H318 Provoca lesiones oculares graves. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P501 Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales. Para obtener más información, consulte la Ficha de datos de seguridad disponible en nuestro sitio web.

**ALMACENAMIENTO:** Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado de la luz solar directa, el calor y las llamas expuestas. Temperatura de almacenamiento: <30°C

**COMPOSICIÓN:** 100 g contienen 20 g de etanol, 28 g de 1-propanol, 0,056 g de compuestos de amonio cuaternario, auxiliares y agua.

## IT (Italiano)

**DESTINAZIONE D'USO:** Bepro Disinfectant Spray è un detergente e disinfettante per superfici a base di alcol e composti di ammonio quaternario. Il disinfettante spray è ideale per la disinfezione e la pulizia rapida di dispositivi medici non invasivi come tavoli operatori, barelle, aste portaflebo e poltrone odontoiatriche. Il basso contenuto di alcol, inferiore al 50%, garantisce l'alta compatibilità dei materiali e riduce il rischio di allergie e irritazione cutanea. Bepro Disinfectant Spray ha un profumo discreto di limone.

**UTILIZZATORI PREVISTI:** Il prodotto è destinato a essere utilizzato da odontoiatri o operatori sanitari con competenze specifiche nel processo di disinfezione di dispositivi medici. Il prodotto non deve essere usato direttamente sui pazienti.

**SPETTRO D'AZIONE:** Battericida (EN 13727:2012 + A2:2015\*, EN 16615:2015\*) 60 sec.; tuberculocida (EN 14348:2005\*) 60 sec.; micobattericida (EN 14348:2005\*) 60 sec.; leviticida (EN 13624:2013\*, EN 16615:2015\*) 60 sec.; virus capsulati (EN 14476:2013 + A1:2015\*) 15 sec.; virucida (EN 14476:2013 + A1:2015\*) 60 sec.

\* Testato a basso carico organico / \* Testato ad alto carico organico

**ISTRUZIONI PER L'USO:** Per la protezione della propria persona, indossare quanti monouso e occhiali protettivi. Inumidire completamente e pulire l'intera superficie del dispositivo medico. Lasciare agire il disinfettante e rispettare il tempo di contatto. Utilizzare solo su materiali compatibili con l'alcool. Prima del primo utilizzo, testare la compatibilità del materiale applicando il disinfettante su una piccola area non appariscente. Un elenco di materiali compatibili e incompatibili è disponibile sul nostro sito web. In caso di dubbi sulla composizione materiale del dispositivo medico, contattare il produttore prima dell'uso.

**LIMITAZIONI:** SOLO PER USO PROFESSIONALE. Non utilizzabile su dispositivi medici invasivi. Non mescolare con altri prodotti. Assicurarsi che tutto lo sporco visibile sia stato rimosso prima della disinfezione.

**MANIPOLAZIONE:** PERICOLO H226 Liquido e vapori infiammabili. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, vintole, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. P233 Tenere il recipiente ben chiuso. P261 Evitare di respirare i fumi/la nebbia/il vapore/i gli aerosol.

**UTILIZZADORES PREVISTOS:** O produto destinado a ser utilizado por profissionais dentários ou de saúde com conhecimentos específicos sobre o processo de desinfeção de dispositivos médicos. O produto não se destina a utilização direta no paciente.

**ESPECTRO EFICAZ:** Bactericida (EN 13727:2012 + A2:2015\*, EN 16615:2015\*) 60 seg.; tuberculocida (EN 14348:2005\*) 60 seg.; micobactericida (EN 14348:2005\*) 60 seg.; levaduricida (EN 13624:2013\*, EN 16615:2015\*) 60 seg.; virus envelopados (EN 14476:2013 + A1:2015\*) 15 seg.; virucida (EN 14476:2013 + A1:2015\*) 60 seg.

\* Testado sob carga orgânica baixa / \* Testado sob carga orgânica elevada

**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:** Para sua proteção, use luvas descartáveis e óculos de segurança. Humedecer completamente e limpar toda a superfície do dispositivo médico. Deixar o desinfectante actuar e respeitar o tempo de contacto. Utilização apenas em materiais compatíveis com o álcool. Antes da primeira utilização, testar a compatibilidade do material, aplicando o desinfectante numa pequena área pouco visível. Está disponível no nosso site uma lista de materiais compatíveis e incompatíveis. Em caso de dúvida quanto à composição do material do dispositivo médico, contacte o fabricante antes de o utilizar.

\* Testado sob carga orgânica baixa / \* Testado sob carga orgânica elevada

**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:** Para sua proteção, use luvas descartáveis e óculos de segurança. Humedecer completamente e limpar toda a superfície do dispositivo médico. Deixar o desinfectante actuar e respeitar o tempo de contacto. Utilização apenas em materiais compatíveis com o álcool. Antes da primeira utilização, testar a compatibilidade do material, aplicando o desinfectante numa pequena área pouco visível. Está disponível no nosso site uma lista de materiais compatíveis e incompatíveis. Em caso de dúvida quanto à composição do material do dispositivo médico, contacte o fabricante antes de o utilizar.

**LIMITAÇÕES:** APENAS PARA USO PROFESIONAL. Não deve ser usado em dispositivos médicos invasivos. Não misturar com outros produtos. Certifique-se de que toda a sujidade visível foi removida antes da desinfeção.

**MANUSEAMENTO:** PERIGO H226 Líquido e vapor inflamáveis. H318 Provoca lesões oculares graves. H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faldas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. P233 Manter o recipiente bem fechado. P261 Evitar respirar os fumos/nevoeiros/vapores/aerossóis. P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. P305 + P351 + P338 EN ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P501 Descartar o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos locais e nacionais. Para mais informação, consulte a Ficha de Dados de Segurança disponível no nosso site.

**ARMAZENAMENTO:** Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado. Manter afastado da luz solar directa, do calor e da chama aberta. Temperatura de armazenamento: <30°C

**COMPOSIÇÃO:** 100 g contém 20 g de etanol, 28 g de 1-propanol, 0,056 g de compostos de amónio quaternário, auxiliares e água.

materiaux compatibles et incompatibles est disponible sur notre site web. Si vous n’êtes pas sûr de la composition du matériau du dispositif médical, contactez le fabricant avant utilisation.

**LIMITES:** POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT. Ne convient pas aux dispositifs médicaux invasifs. Ne pas mélanger avec d’autres produits. S’assurer que toute contamination visible a été éliminée avant la désinfection.

**MANIPULATION:** DANGER H226 Liquide et vapeurs inflammables. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

**UTILIZATEURS PREVISTIS:** Il prodotto è destinato a essere utilizzato da odontoiatri o operatori sanitari con competenze specifiche nel processo di disinfezione di dispositivi medici. Il prodotto non deve essere usato direttamente sui pazienti.

**SPETTRO D'AZIONE:** Battericida (EN 13727:2012 + A2:2015\*, EN 16615:2015\*) 60 sec.; tuberculocida (EN 14348:2005\*) 60 sec.; micobactericida (EN 14348:2005\*) 60 sec.; glistodend (EN 13624:2013\*, EN 16615:2015\*) 60 sec.; ingekapselde virussen (EN 14476:2013 + A1:2015\*) 15 sec; virusdoend (EN 14476:2013 + A1:2015\*) 60 sec.

\* Getest onder lage organische belasting / \* Getest onder hoge organische belasting

**GERBUKINGSAANWIJZING:** Draag voor uw bescherming wegwerphandschoenen en een veiligheidsbril. Het gehele oppervlak van het medisch hulpmiddel volledig bevochtigen en afvegen. Desinfectiemiddel laten inwerken en contacttijd aanhouden. Alleen gebruiken op alcohol compatibele materialen. Test voor het eerste gebruik de materiaalcompatibiliteit door het desinfectiemiddel op een kleine onopvallende plaats aan te brengen. Een lijst met compatibele en incompatibele materialen is beschikbaar op onze website. Als u twijfelt over de materiaalsamenstelling van het medische hulpmiddel, neem dan voor gebruik contact op met de fabrikant.

**BEPERKINGEN:** ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. Niet voor gebruik op invasieve medische apparaten. Niet mengen met andere producten. Zorg ervoor dat alle zichtbare vervuiling is verwijderd voordat u gaat desinfecteren.

**BEHANDLING:** GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H336 Kan sloopirigheid of duizeligheid veroorzaken. P210 Verwijderd houden van warme, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P233 In goed gesloten verpakking bewaren. P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitsnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlens verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig met relevante verordeningen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad op onze website.

**OPSLAG:** Opslaan in een koele, droge en goed geventileerde ruimte. Vermijd direct zonlicht, hitte en open vuur. Bewaartemperatuur: < 30°C

**SAMENSTELLING:** 100 g bevat 20 g ethanol, 28 g 1-propanol, 0,056 g quaternaire ammoniumverbindingen, hulpstoffen en water.

**INSTRUCIONES DE UTILIZACIÓN:** Para su protección, use luvas descartáveis e óculos de segurança. Humedecer completamente e limpar toda a superfície do dispositivo médico. Deixar o desinfectante actuar e respeitar o tempo de contacto. Utilização apenas em materiais compatíveis com o álcool. Antes da primeira utilização, testar a compatibilidade do material, aplicando o desinfectante numa pequena área pouco visível. Está disponível no nosso site uma lista de materiais compatíveis e incompatíveis. Em caso de dúvida quanto à composição do material do dispositivo médico, contacte o fabricante antes de o utilizar.

**ESPECTRO EFICAZ:** Bactericida (EN 13727:2012 + A2:2015\*, EN 16615:2015\*) 60 seg.; tuberculocida (EN 14348:2005\*) 60 seg.; micobactericida (EN 14348:2005\*) 60 seg.; levaduricida (EN 13624:2013\*, EN 16615:2015\*) 60 seg.; virus envelopados (EN 14476:2013 + A1:2015\*) 15 seg.; virucida (EN 14476:2013 + A1:2015\*) 60 seg.

\* Testado sob carga orgânica baixa / \* Testado sob carga orgânica elevada

**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:** Para sua proteção, use luvas descartáveis e óculos de segurança. Humedecer completamente e limpar toda a superfície do dispositivo médico. Deixar o desinfectante actuar e respeitar o tempo de contacto. Utilização apenas em materiais compatíveis com o álcool. Antes da primeira utilização, testar a compatibilidade do material, aplicando o desinfectante numa pequena área pouco visível. Está disponível no nosso site uma lista de materiais compatíveis e incompatíveis. Em caso de dúvida quanto à composição do material do dispositivo médico, contacte o fabricante antes de o utilizar.

**LIMITAÇÕES:** APENAS PARA USO PROFESIONAL. Não deve ser usado em dispositivos médicos invasivos. Não misturar com outros produtos. Certifique-se de que toda a sujidade visível foi removida antes da desinfeção.

**MANUSEAMENTO:** PERIGO H226 Líquido e vapor inflamáveis. H318 Provoca lesões oculares graves. H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faldas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. P233 Manter o recipiente bem fechado. P261 Evitar respirar os fumos/nevoeiros/vapores/aerossóis. P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. P305 + P351 + P338 EN ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P501 Descartar o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos locais e nacionais. Para mais informação, consulte a Ficha de Dados de Segurança disponível no nosso site.

**ARMAZENAMENTO:** Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado. Manter afastado da luz solar directa, do calor e da chama aberta. Temperatura de armazenamento: <30°C

**COMPOSIÇÃO:** 100 g contém 20 g de etanol, 28 g de 1-propanol, 0,056 g de compostos de amónio quaternário, auxiliares e água.

## NL (Nederlands)

**BEOOGD DOEL:** Bepro Disinfectant Spray is een desinfectiemiddel en reiniger voor oppervlakken op basis van alcoholen en quaternaire ammoniumverbindingen. De desinfecterende spray is ideaal voor de snelle desinfectie en reiniging van niet-invasieve medische hulpmiddelen als niet-operatiefafels, brancards, infuuspalen en tandartsstoelen. Het lage alcoholpercentage van minder dan 50% zorgt voor een hoge materiaalverdraagzaamheid en vermindert de kans op allergieën en huidirritaties. Bepro Disinfectant Spray heeft een discrete citroengeur.

**BEOOGDE GEBRUIKERS:** Het product is bedoeld voor gebruik door tandheelkundige of zorgverleners met specifieke kennis over de desinfectie van medische hulpmiddelen. Het product mag niet rechtstreeks bij patiënten worden gebruikt.

**WERKINGSPECTRUM:** Bacteriedodend (EN 13727:2012 + A2:2015\*, EN 16615:2015\*) 60 sec; tuberculocida (EN 14348:2005\*) 60 sec; mycobactericida (EN 14348:2005\*) 60 sec; gistdodend (EN 13624:2013\*, EN 16615:2015\*) 60 sec; ingekapselde virussen (EN 14476:2013 + A1:2015\*) 15 sec; virusdoend (EN 14476:2013 + A1:2015\*) 60 sec.

\* Getest onder lage organische belasting / \* Getest onder hoge organische belasting

**GERBUKINGSAANWIJZING:** Draag voor uw bescherming wegwerphandschoenen en een veiligheidsbril. Het gehele oppervlak van het medisch hulpmiddel volledig bevochtigen en afvegen. Desinfectiemiddel laten inwerken en contacttijd aanhouden. Alleen gebruiken op alcohol compatibele materialen. Test voor het eerste gebruik de materiaalcompatibiliteit door het desinfectiemiddel op een kleine onopvallende plaats aan te brengen. Een lijst met compatibele en incompatibele materialen is beschikbaar op onze website. Als u twijfelt over de materiaalsamenstelling van het medische hulpmiddel, neem dan voor gebruik contact op met de fabrikant.

**BEPERKINGEN:** ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. Niet voor gebruik op invasieve medische apparaten. Niet mengen met andere producten. Zorg ervoor dat alle zichtbare vervuiling is verwijderd voordat u gaat desinfecteren.

**BEHANDLING:** GEVAAR H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H336 Kan sloopirigheid of duizeligheid veroorzaken. P210 Verwijderd houden van warme, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P233 In goed gesloten verpakking bewaren. P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitsnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlens verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig met relevante verordeningen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad op onze website.

**OPSLAG:** Opslaan in een koele, droge en goed geventileerde ruimte. Vermijd direct zonlicht, hitte en open vuur. Bewaartemperatuur: < 30°C

**SAMENSTELLING:** 100 g bevat 20 g ethanol, 28 g 1-propanol, 0,056 g quaternaire ammoniumverbindingen, hulpstoffen en water.

**INSTRUCIONES DE UTILIZACIÓN:** Para su protección, use luvas descartáveis e óculos de segurança. Humedecer completamente e limpar toda a superfície do dispositivo médico. Deixar o desinfectante actuar e respeitar o tempo de contacto. Utilização apenas em materiais compatíveis com o álcool. Antes da primeira utilização, testar a compatibilidade do material, aplicando o desinfectante numa pequena área pouco visível. Está disponível no nosso site uma lista de materiais compatíveis e incompatíveis. Em caso de dúvida quanto à composição do material do dispositivo médico, contacte o fabricante antes de o utilizar.

**ESPECTRO EFICAZ:** Bactericida (EN 13727:2012 + A2:2015\*, EN 16615:2015\*) 60 seg.; tuberculocida (EN 14348:2005\*) 60 seg.; micobactericida (EN 14348:2005\*) 60 seg.; levaduricida (EN 13624:2013\*, EN 16615:2015\*) 60 seg.; virus envelopados (EN 14476:2013 + A1:2015\*) 15 seg.; virucida (EN 14476:2013 + A1:2015\*) 60 seg.

\* Testad under hög grad av organisk belastning / \* Testad under hög grad av organisk belastning

**BRUKSANVISNING:** Bär engångshandskar och skyddsglasögon som skydd. Fukta fullständigt och torka av hela den medicinska ordningens yta. Låt desinfektionsmedlet verka och följa kontakttiden. Använd endast på alkoholkompatibla material. Före första användningen, testa materialkompatibiliteten genom att applicera desinfektionsmedlet på ett litet osynligt område. En lista över kompatibla och inkompatibla material finns på vår webbplats. Om du är osäker på den medicintekniska produktens materialsamnsättning, kontakta tillverkaren innan användning.

**BEGRÄNSNINGAR:** ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING. Ej för användning på invasiva medicintekniska produkter. Blanda inte med andra produkter. Säkerställ att all synligt smut har avlägsnats innan desinfektion.

**HANTERING:** FARA H226 Brandfarlig vätska och ånga. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H336 Kan göra att man blir dåsig eller ömtåklad. P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuds. P233 Behållarna ska vara väl tillslutna. P261 Undvik att andas damm/ångor/gaser/dimma/ångor/sprej. P280 Använd skyddshandskar/skyddsglasögon/skyddsglasögon/ansiktsdömlar. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinsor om det går lätt. Fortsätt att skölja. P501 Dumping av innehåll/behållare i inlighet med gällande föreskrifter. För mer information se det säkerhetsdatablad som finns på vår webbplats.

**FÖRVARING:** Förvara på en sval, torr och väl ventilerad plats. Förvaras utom räckhåll för direkt solljus, värme och öppen eld. Förvarings-temperatur: < 30 °C

**SÄMNINGSSÄTTNING:** 100 g innehåller 20 g etanol, 28 g 1-propanol, 0,056 g kvartär ammoniumföreningar, hjälpämnen och vatten.

## PL (Polski)

**CEL IZNAČENJE:** Bepro Disinfectant Spray je sredstvo za dezinfekciju i čišćenje površina na osnovi alkohola i kvaternarnih amonijevih jedinjenja. Sprej je idealan za brzo dezinfekciju i čišćenje površina od neinvazivnih medicinskih uređaja, kao što su stolice operativne, nosači infuzijskih aparata i stolice zubne. Niska zawartość alkoholu i niski stężenie amoniów kwaternarnych zmniejszają ryzyko alergii i podrażnień skóry, a jednocześnie zapewnia wysoką tolerancję materiałową. Bepro Disinfectant Spray ma delikatny, cytrynowy zapach.

**OSOBNE WSKAZANIA:** Produkt jest przeznaczony do użycia przez pracowników z branży dentystycznej lub służby zdrowia posiadających odpowiednie wykształcenie i wiedzę z dziedziny medycyny. Produkt nie jest przeznaczony do bezpośredniego stosowania u pacjentów.

**SKŁAD I WYKONANIE:** Produkt jest przeznaczony do użycia przez pracowników z branży dentystycznej lub służby zdrowia posiadających odpowiednie wykształcenie i wiedzę z dziedziny medycyny. Produkt nie jest przeznaczony do bezpośredniego stosowania u pacjentów.

**SKŁAD I WYKONANIE:** Produkt jest przeznaczony do użycia przez pracowników z branży dentystycznej lub służby zdrowia posiadających odpowiednie wykształcenie i wiedzę z dziedziny medycyny. Produkt nie jest przeznaczony do bezpośredniego stosowania u pacjentów.

**SKŁAD I WYKONANIE:** Produkt jest przeznaczony do użycia przez pracowników z branży dentystycznej lub służby zdrowia posiadających odpowiednie wykształcenie i wiedzę z dziedziny medycyny. Produkt nie jest przeznaczony do bezpośredniego stosowania u pacjentów.

**SKŁAD I WYKONANIE:** Produkt jest przeznaczony do użycia przez pracowników z branży dentystycznej lub służby zdrowia posiadających odpowiednie wykształcenie i wiedzę z dziedziny medycyny. Produkt nie jest przeznaczony do bezpośredniego stosowania u pacjentów.

**SKŁAD I WYKONANIE:** Produkt jest przeznaczony do użycia przez pracowników z branży dentystycznej lub służby zdrowia posiadających odpowiednie wykształcenie i wiedzę z dziedziny medycyny. Produkt nie jest przeznaczony do bezpośredniego stosowania u pacjentów.

**SKŁAD I WYKONANIE:** Produkt jest przeznaczony do u