

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf **wh.com**



Auswertungsbogen

Anleitung

Systemische Erkrankungen:

Grunderkrankung

Ja: Risiko im Zusammenhang mit der Grunderkrankung oder orale Manifestationen
^M medikamentös bedingte orale Nebenwirkung, ^K krankheitsbedingte orale Auswirkung

Zusatz: modulierender Krankheitsparameter und Behandlungsempfehlungen auf Basis der Grunderkrankung, Nebenwirkungen und orale Manifestationen

Medikation: wegen der Grunderkrankung einzunehmende Medikation hat Einfluss auf die Mundgesundheit (Nebenwirkungen und/oder Komplikationen)

Arzneimittel:

Orales Krankheitsbild	Dareichform	Medikation
als Nebenwirkung der Medikation	wirkt modulierend auf Erkrankungsrisiko	Medikamentengruppe und Anwendungsgebiet

Orales Krankheitsbild - Parameter

Komplikationsrisiko	Erkrankungsrisiko
Komplikation im Rahmen einer zahnärztlichen Behandlung	Entstehen und/oder Progression einer oralen Erkrankung
gering	gering
mittel	mittel
hoch	hoch

Trifft folgendes für Sie zu

Beschwerden Mund/Zähne

J Komplikationen, orale Manifestation u Behandlungsempfehlung

welche

Gewohnheiten

Zucker-/säurehaltige Ernährung	selten/nie	häufig	täglich
Rauchen Sie	Zigaretten/Tag:	<10	>10
Haben Sie geraucht	Zigaretten/Tag: Für wie lange:	Rauchfreie Jahre > 5 Jahre	Pack-Years < 5 Jahre

Zusatzinformationen

Alkoholabhängigkeit (trocken)	J Keine alkoholhaltigen Produkte (Mundspülungen)
Allergien/Unverträglichkeiten	Allergen meiden (Pasten-/Pulverinhaltsstoffe); medikamentöse Mundtrockenheit M Notfallmedikation
Schwangerschaft	Woche 2.Trimenon: Belastbarkeit 1./3.Trimenon: kein elektiver Eingriff; gyn. Konsil bei Risikoschwangerschaft

Systemische Erkrankungen

Komplikationen, mögl. orale Manifestation, Begleitsymptome Medikation, Behandlungsempfehlung

Medikation

Bekannte Herzerkrankungen

Variable Belastbarkeit, Medikation prüfen, oft orale Nebenwirkungen

Angina pectoris	Belastbarkeit, ^M Gingivaveränderungen, Recall: 3-4 Monate	M Mundtrockenheit Gingivawucherung
Herzrhythmusstörungen	Belastbarkeit, ^M Gingivaveränderungen, Recall: 3-4 Monate	M Mundtrockenheit Gingivawucherung
Koronare Herzerkrankungen	Belastbarkeit, ^M Gingivaveränderungen, Recall: 3-4 Monate	M Mundtrockenheit Gingivawucherung
Herzinsuffizienz	Belastbarkeit, ^M Gingivaveränderungen, Recall: 3-4 Monate	M Mundtrockenheit Gingivawucherung
Künstliche Herzklappe	Antibiotika: Endokarditisprophylaxe, Infektionsrisiko	M
Angeborene zyanotische Vitien	Antibiotika: Endokarditisprophylaxe, Infektionsrisiko	M
Endokarditis Vorgeschichte	Antibiotika: Endokarditisprophylaxe, Infektionsrisiko	M
Herzinfarkt	> 6 Monate: Belastbarkeit < 6 Monate: kein elektiver Eingriff	M
Stent-/Bypass-Operation	> 6 Monate: Belastbarkeit < 6 Monate: kein elektiver Eingriff	M
Herzschrittmacher	Herzschrittmacherkompatible Schall-/Ultraschallgeräte	M
Hypertonie/Bluthochdruck	≥180/110mmHg: Kein elektiver Eingriff, Notfallmedikation, CAVE: Vasokonstriktiva, Pulverstrahlen, abrupte Lageänderungen	M Gingivawucherung Mundtrockenheit

Bekannte Lungen-/Atemwegserkrankung		Sensibel bei Aerosol, flacher Lagerung, Inhaltsstoffen; Medis m oralen Nebenwirkungen	
COPD/Atemwegsverengung	eingestellt: Aerosolbildung (Pulverstrahl) vermeiden, Lagerung, ^K Parodontitis Recall: 6 Monate	nicht eingestellt	M Mundtrockenheit
Asthma bronchiale	eingestellt: Dosisanpassung, Aerosolbildung (Pulverstrahl) vermeiden, Recall: 6 Monate	nicht eingestellt	M immunsup. Dauermed. Gingivawucherung
Bekannte Knochen-/Gelenkserkrankungen		Dauerentzündung/Parodontitisrisiko, Antibiotikaprophylaxe b Entzündungsrisiko	
M Bechterew/Spondylarthropathie	^K Parodontitis, evtl. Antibiotika b. Immunsup., Recall: 3-6 Monate		M Mundtrockenheit
Rheumatoide Arthritis			M Gingivawucherung Immunsuppression Kiefernekrose b.
Osteoporose	^K Parodontitis, evtl. Antibiotika, Recall 3-6 Monate		M Bisphosphonat
Bekannte Erkrankungen des Verdauungssystems		Dauerentzündung/Parodontitisrisiko, Antibiotikaprophylaxe b Entzündungsrisiko	
Gastritis	o Reflux	m Reflux	M Mundtrockenheit Antibiotikabeeinflussung
Morbus Crohn		^K Parodontitis, evtl. Antibiotika b. Immunsup., Recall: 3-6 Monate	M Gingivawucherung Immunsuppression
Collitis ulcerosa			M Immunsuppression
Bekannte Organ-/Drüsen-/Nervenerkrankungen			
Glaukom/ grüner Star/Augeninnendruck	Adrenalinverzicht (Lokalanästhesie)		M
Nierenerkrankungen	keine Dialyse: Recall 6 Monate ^K oral multimorbid, Fluorid, Speichelstimulation	Dialyse: Recall 3 Monate, ^K oral multimorbid, Antibiotika, Behandlung am Tag nach der Dialyse	wirkt auf Medikamentenmetabolismus, Dosisanpassung
Tumorerkrankungen	Adrenalinverzicht bei Phäochromozytom (Lokalanästhesie)		M
Hyperthyreose	Adrenalinverzicht (Lokalanästhesie), Jodverzicht		M
Diabetes mellitus	HbA1c ≤7%: Recall 6 Monate ^K Parodontitis, Unterzucker vermeiden	HbA1c >7%: Infektionsrisiko, Recall 3-4 Monate ^K Parodontitis, Unterzucker vermeiden	
Epilepsie (Notfallmedikation)	stabil: Recall 3 Monate Stressoren meiden	nicht-stabil: Recall 3 Monate Stressoren meiden	M Mundtrockenheit, Gingivawucherung
Bekannte Infektionserkrankungen		Ansteckungsrisiko, Schutzausrüstung, wenn mögl. Ausheilung abwarten, Immunschwäche	
Hepatitis/Gelbsucht (u Varianten)	Ausgeheilt, eingeschränkte Leberfunktion möglich	aktiv/chronisch: Recall 3 Monate; ^K orale Manifestation, evtl. Antibiotikaprophylaxe, eingeschränkte Leberfunktion	
HIV/AIDS	Ansteckungsschutz, orale Manifestation, Medikamentennebenwirkungen	Immunschwäche, Antibiotikaprophylaxe, Recall: 3 Monate	
Tuberkulose	Ansteckungsschutz, Aerosolbildung meiden, Ausheilung abwarten, Immunschwäche		
Infektionsgebiet/Kontakt (letzte 14 Tage)	Art der Infektion/Übertragungswege, Inkubationszeit abwarten, Prophylaxe/Behandlung beenden		
Behandlungen/Therapien/Operationen		Alternativmedizin, Beeinflussung von Wirkmechanismen	
Andere Therapieformen	welche		
Chemotherapie	beendet: Recall 3-4 Monate therapiebedingte orale Folgeschäden	laufend: Recall 3 Monate, MSH, Entzündungen u Pilzinfektionen kontrollieren	
Bestrahlung Hals-/Kopfbereich	beendet (> 6 Wochen); evtl. Antibiotika, Osteoradionekrose, Mundtrockenheit	laufend: keine invasiven Therapien Osteoradionekrose, Mundtrockenheit	
Immunsuppression	Antibiotikaprophylaxe, bis 3 Monate post-OP keine Behandlung, Recall: 3 Monate, Medikamentennebenwirkungen		M Gingivawucherung, Mundtrockenheit
Endoprothese (künstl. Gelenke)	> 2 Jahre oder ohne Komplikationen; antiseptische Mundspülung	< 2 Jahre oder mit Komplikationen; evtl. Antibiotika	
Nehmen Sie aktuell Medikamente			
Nebenwirkung (sehr häufig – häufig)	Modulator Darchform		Medikation (Krankheitsbild)
Mundtrockenheit	Monotherapie Recall: 6 Monate	Kombinationstherapie Recall: 3-4 Monate	Protonenpumpenhemmer (Magen-, Darmgeschwüre, Refluxoesophagitis, sog. Magenschutz), Wirkbeeinflussung von Antibiotika
	Monotherapie Recall: 6 Monate	Kombinationstherapie Recall: 3-4 Monate	Antihistaminika (Allergien)
	Monotherapie Recall: 6 Monate	Kombinationstherapie Recall: 3-4 Monate	Antihypertonika: Betablocker, ACE-Hemmer, Diuretika, Kalziumantagonisten (Blutdrucksenkung)
	Monotherapie Recall: 6 Monate	Kombinationstherapie Recall: 3-4 Monate	Antidepressiva
Gingivawucherung	Recall: 3-4 Monate		Anticholinergika (COPD, Blasenerkrankung)
	Monotherapie Recall: 3-4 Monate	Kombinationstherapie Recall: 3-4 Monate Antibiotikaprophylaxe	Antihypertonika: Kalziumantagonisten (Blutdrucksenkung)
	Monotherapie ASS	Kombinationstherapie ASS + Clopidogrel	Antikonvulsiva (Epilepsie, off-label bei Herzrhythmusstörung)
Blutungsrisiko	Falithrom, Marcumar INR 2-3	Falithrom, Marcumar INR >3	Immunsuppressiva: Glucocorticoide, Calcineurinhemmer (rheumat. Erkrankungen, Asthma bronchiale, Organtransplantation, Mb. Crohn)
	NOAKs (Xarelto)		Antikoagulantien, Thrombozytenaggregationshemmer (z.B. bei div. Herzerkrankungen zur Thromboembolie-Prophylaxe)
Kiefernekrosen			Immunsuppressiva: Monoklonale Antikörper (Mamma-, Prostatakarzinom, rheumat. Erkrankungen)
	oral	iv	Bisphosphonate (Osteoporose)
Einnahme Immunsuppressiva		Verringerte Immunantwort – stark erhöhte Anfälligkeit für Infektionen, das heruntergefahrere Immunsystem kann Multimorbidität verursachen (div. orale Manifestationen u.a. Pilzinfektionen), Empfehlung für Antibiotikaprophylaxe (im Einzelfall abwägen)	