

#whdentalwerk



video.wh.com

Ora disponibile presso

il vostro rivenditore

o su **wh.com**

Modulo di valutazione

Istruzioni

Malattie sistemiche:

Malattia di base

Si: rischio correlato alla malattia di base o manifestazioni orali

^M effetto collaterale orale causato da farmaci, ^K effetto orale causato da malattia

Aggiunta: modulazione dei parametri della malattia e raccomandazioni di trattamento basate sulla malattia di base, sugli effetti collaterali e sulle manifestazioni orali

Farmaco: i farmaci da assumere a causa della malattia di base hanno un'influenza sulla salute orale (effetti collaterali e/o complicanze)

Prodotto medicinale:

Quadro clinico orale

come effetto collaterale del farmaco

Metodo di somministrazione

ha un'azione modulante sul rischio di malattia

Farmaco

Gruppo di farmaci e area di applicazione

Quadro clinico orale - Parametri

Rischio di complicanze

Complicanza nel corso di un trattamento odontoiatrico

basso
medio
elevato

Rischio di malattia

Sviluppo e/o progressione di una malattia orale

basso
medio
elevato

Quanto segue si applica a Lei

Disturbi a bocca/denti

S Complicanze, manifestazione orale e raccomandazione per il trattamento

quali

Abitudini

Alimentazione ricca di zucchero/sale

raramente/mai	spesso	tutti i giorni
---------------	--------	----------------

Fumatore

Sigarette/giorno: <10	>10
-----------------------	-----

Ex fumatore

Sigarette/giorno: Per quanto tempo? > 5 anni	< 5 anni	Pacchetti/anno
--	----------	----------------

Informazioni aggiuntive

Dipendenza dall'alcol (nessuna)

S Nessun prodotto contenente alcol (collutorio)

Allergie/intolleranze

Evitare gli allergeni (ingredienti in pasta/polvere); secchezza del cavo orale causata da farmaci **M** Farmaco d'emergenza

Gravidanza

Settimana **2° trimestre: Resistenza**
1°/3° trimestre: nessun intervento elettivo, consulenza ginecologica gravidanza ad alto rischio

Malattie sistemiche

Complicanze, possibile manifestazione orale, sintomi concomitanti da farmaco, raccomandazione per il trattamento

Farmaco

Cardiopatie note

Resistenza variabile, controllare i farmaci, spesso effetti collaterali orali

Angina pectoris

Resistenza, ^M modifiche gengivali, recall: 3-4 mesi **M** Secchezza cavo orale Iperplasia gengivale

Aritmie cardiache

Resistenza, ^M modifiche gengivali, recall: 3-4 mesi **M** Secchezza cavo orale Iperplasia gengivale

Cardiopatie coronariche

Resistenza, ^M modifiche gengivali, recall: 3-4 mesi **M** Secchezza cavo orale Iperplasia gengivale

Insufficienza cardiaca

Resistenza, ^M modifiche gengivali, recall: 3-4 mesi **M** Secchezza cavo orale Iperplasia gengivale

Valvola cardiaca artificiale

Antibiotici: profilassi dell'endocardite, rischio di infezione **M**

Cardiopatia congenita cianotica

Antibiotici: profilassi dell'endocardite, rischio di infezione **M**

Endocardite nell'anamnesi

Antibiotici: profilassi dell'endocardite, rischio di infezione **M**

Infarto cardiaco

> 6 mesi: Resistenza < 6 mesi: nessun intervento elettivo **M**

Intervento per impianto di stent/bypass

> 6 mesi: Resistenza < 6 mesi: nessun intervento elettivo **M**

Pacemaker cardiaco

Strumenti a suoni/ultrasuoni compatibili con pacemaker **M**

Ipertonia/ipertensione

≥180/110 mmHg: nessun intervento elettivo, terapia d'emergenza, CAVE: vasocostrittori, air-polisher, bruschi cambi di posizione **M** Secchezza cavo orale Iperplasia gengivale

Malattie polmonari/respiratorie note		Sensibile ad aerosol, posizione supina, ingredienti; farmaco con effetti collaterali orali	
BPCO/costrizione delle vie respiratorie	Regolazioni: evitare la formazione di aerosol (air polishing), posizione distesa, ^K parodontite recall: 6 mesi	Nessuna regolazione	M Secchezza cavo orale
Asma bronchiale	Regolazioni: Adattamento della dose, evitare la formazione di aerosol (air polishing), recall: 6 mesi	Nessuna regolazione	M farm. a lungo term. immunosopp. Iperplasia gengivale
Malattie delle ossa/articolari note		Infiammazione permanente/rischio di parodontite, rischio di infiammazione correlato a profilassi antibiotica	
Malattia di Bechterew/Spondiloartrite	^K Parodontite, possibile immunosopp. causata da antibiotici, recall: 3-6 mesi		M Secchezza cavo orale
Artrite reumatoide			M Iperplasia gengivale
Osteoporosi			M Terapia immunosopp. necrosi della mascella dovuta a bisfosfonato
Malattie note dell'apparato digerente		Infiammazione permanente/rischio di parodontite, rischio di infiammazione correlato a profilassi antibiotica	
Gastrite	senza reflusso	con reflusso	M Secchezza cavo orale Influenza di antibiotici
Morbo di Crohn	^K Parodontite, possibile immunosopp. causata da antibiotici, recall: 3-6 mesi		M Iperplasia gengivale
Colite ulcerosa			M Terapia immunosopr.
Malattie note di organi/ghiandole/nervi			
Glaucoma/stella verde/pressione intraoculare	Evitare l'adrenalina (anestesia locale)		M
Malattie dei reni	nessuna dialisi: Recall 6 mesi ^K multimorbilità orale, fluoruro, stimolazione della saliva	Dialisi: Recall 3 mesi; ^K multimorbilità orale, antibiotici, trattamento un giorno dopo la dialisi	agisce sul metabolismo dei farmaci, adattamento della dose
Patologie tumorali	Evitare l'adrenalina in caso di feocromocitoma (anestesia locale)		M
Iperteroidismo	Evitare l'adrenalina (anestesia locale), evitare lo iodio		M
Diabete mellito	HbA1c ≤7%: Recall 6 mesi ^K Parodontite, evitare ipoglicemia	HbA1c >7%: Rischio di infezione, recall 3-4 mesi ^K Parodontite, evitare ipoglicemia	
Epilessia (farmaco di emergenza)	stabile: Recall 3 mesi Evitare fattori di stress	non stabile: Recall 3 mesi Evitare fattori di stress	M Secchezza cavo orale, Iperplasia gengivale
Malattie infettive note		Rischio di infezione, dispositivi di protezione, se possibile aspettare la completa guarigione, immunodeficienza	
Epatite/ittero (e varianti)	Guarito, possibile compromissione della funzionalità epatica	attivo/cronico: Recall 3 mesi; ^K Manifestazione orale, eventuale profilassi antibiotica, compromissione della funzionalità epatica	
HIV/AIDS	Protezione dalle infezioni, manifestazione orale, effetti collaterali di farmaci, immunodeficienza, profilassi antibiotica, recall: 3 mesi		
Tubercolosi	Protezione dalle infezioni, evitare la formazione di aerosol, attendere la completa guarigione, immunodeficienza		
Regione/contatto di infezione (ultimi 14 giorni)	Tipo di infezione/vie di trasmissione, attendere il periodo di incubazione, interrompere profilassi/trattamento		
Trattamenti/terapie/operazioni		Medicina alternativa, influenza sui meccanismi d'azione	
Altre forme di terapia	quali		
Chemioterapia	terminata: Recall 3-4 mesi, danni orali dovuti a terapia	in corso: Recall 3 mesi, OM, controllare infiammazioni e infezioni fungine	
Radioterapia della regione collo/testa	terminata (> 6 settimane); event. antibiotici, osteoradionecrosi, secchezza del cavo orale	in corso: nessuna terapia invasiva Osteoradionecrosi, secchezza del cavo orale	
Terapia immunosoppressiva	Profilassi antibiotica, nessun trattamento fino a 3 mesi dopo l'operazione, recall: 3 mesi, effetti collaterali dovuti a farmaci		M Iperplasia gengivale, secchezza del cavo orale
Endoprotesi (articolazioni artificiali)	> 2 anni o senza complicanze; collutorio antisettico	< 2 anni o con complicanze; eventualmente antibiotici	
Attualmente assume farmaci?			
Effetto collaterale (molto frequente - frequente)		Metodo di somministrazione modulatore	Farmaco (quadro clinico)
Secchezza del cavo orale	Monoterapia Recall: 6 mesi	Terapia di combinazione Recall: 3-4 mesi	Inibitori della pompa protonica (ulcere gastriche e intestinali, esofagite da reflusso, cosiddetto gastroprotettore), influenza dell'effetto degli antibiotici
	Monoterapia Recall: 6 mesi	Terapia di combinazione Recall: 3-4 mesi	Antistaminici (allergie)
	Monoterapia Recall: 6 mesi	Terapia di combinazione Recall: 3-4 mesi	Antipertensivi: Beta-bloccanti, ACE-inibitori, diuretici, antagonisti del calcio (abbassamento della pressione sanguigna)
	Monoterapia Recall: 6 mesi	Terapia di combinazione Recall: 3-4 mesi	Antidepressivi
			Anticolinergici (BPCO/patologie della vescica)
Iperplasia gengivale	Monoterapia Recall: 6 mesi	Terapia di combinazione Recall: 3-4 mesi	Antipertensivi: Antagonisti del calcio (abbassamento della pressione sanguigna)
		Recall: 3-4 mesi	Anticonvulsivi (epilessia, off-label per aritmia cardiaca)
Rischio di sanguinamento	Monoterapia Recall: 3-4 mesi	Terapia di combinazione Recall: 3-4 mesi Profilassi antibiotica	Immunosoppressori: Glucocorticoidi, inibitori della calcineurina (malattie reumatiche, asma bronchiale, trapianto di organi, malattia di Crohn)
	Monoterapia ASS	Terapia combinata ASS + clopidogrel	
	Falithrom, Marcumar INR 2-3	Falithrom, Marcumar INR >3	Anticoagulanti, inibitori dell'aggregazione piastrinica (ad es. in varie cardiopatie per la profilassi del tromboembolismo)
		NOAC (Xarelto)	
Necrosi della mascella			Immunosoppressori: anticorpi monoclonali (carcinoma della mammella, della prostata, malattie reumatiche)
	orale	iv	Bifosfonati (osteoporosi)
Assunzione di immunosoppressori		Risposta immunitaria ridotta - suscettibilità notevolmente aumentata alle infezioni, il sistema immunitario depresso può causare multimorbilità (varie manifestazioni orali tra cui infezioni fungine), raccomandazione di profilassi antibiotica (valutare il singolo caso)	